

Hedylon, un imprescindible en la clínica veterinaria

El producto de LIVISTO está indicado para el tratamiento sintomático o como tratamiento adyuvante de enfermedades inflamatorias e inmunomediadas en perros y gatos.



La prednisolona es un glucocorticoide sistémico que se usa en un amplio abanico de infecciones. Como inmunosupresora, la prednisolona puede ser usada en la mayoría de enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias, reduciendo la inflamación y la respuesta inmune. Entre las principales indicaciones destaca, sobre todo, su uso en la práctica dermatológica, siendo apta para las diferentes alergias: desde alergias alimentarias¹ hasta medioambientales², pasando por alergias a parásitos³ e, incluso, en casos de dermatitis atópica⁴. Asimismo, el uso de la prednisolona también es idóneo en los procesos autoinmunes y las infecciones neo-

plásicas, pues participa en varias manifestaciones de enfermedades cutáneas, alimentarias, respiratorias, músculo-esqueléticas y hematológicas.

HEDYLON: Dos presentaciones

En su afán por ofrecer las mejores soluciones, **Livisto** cuenta entre su vademécum para animales de compañía con Hedylon, comprimidos de prednisolona para perros y gato. Hed-

ylon está disponible en dos presentaciones diferentes, de 5 y 25 mg, que permiten cubrir cualquier peso. Asimismo, los blísters son perforables y los comprimidos pueden ser divididos en dos o cuatro partes iguales para asegurar una fácil administración y una correcta dosificación para todos los tamaños. Así, por ejemplo, para un perro o un gato de unos 5 kg será suficiente con medio comprimido de 5 mg y para un perro de 50 kg se tendrá que administrar un comprimido completo de 25 mg. Una vez dividido, la vida útil del comprimido es de cuatro días; y la vida útil del fármaco entero es de dos años.


El tratamiento general de Hedylon suele ser de entre una a tres semanas, acorde con las dosis establecidas. Sin embargo, una única dosis puede ser suficiente para ciertas condiciones como un proceso anafiláctico. Además, para minimizar el riesgo de insuficiencia adrenal, puede ser útil un tratamiento a día alternado usando dosis que controlen adecuadamente los síntomas. La administración en perros debe ser por la mañana y en gatos por la noche, coincidiendo con el pico endógeno de cortisol de cada especie. Sea como fuere, los niveles de do-

“La prednisolona se usa principalmente en la práctica dermatológica para tratar varias enfermedades como las alergias”

sificación deben ser controlados estrictamente para asegurar que se utiliza la dosis efectiva más baja, y la dosis y duración del tratamiento, siguiendo el rango de posología registrado, será determinado por el criterio veterinario en función de la severidad del caso clínico.

Con todo, no hay duda de que Hedylon se convierte en un fármaco imprescindible para los veterinarios de animales de compañía. 🐾

Hedylon está disponible en comprimidos divisibles para una fácil administración



A dosis de 0.5 mg/kg:

5 kg = 1/2 Comprimido 5 mg
10 kg = 1 Comprimido 5 mg

5 mg Gatos/Perros pequeños

A dosis de 0.5 mg/kg:

12.5 kg = 1/4 Compr. 25 mg
25 kg = 1/2 Compr. 25 mg
50 kg = 1 Compr. 25 mg

25 mg Perros medianos y grandes

Referencia

1. Reedy L, Miller W, Willemsse T. 1997. Allergic skin diseases of dogs and cats.
2. Buckley L. 2017. Treatment of presumed allergic skin disease in cats. In Practice. Continuing education for veterinary practitioners. Volume 39: 242-254.
3. Bourguignon E, Diegues Guimarães L, Sell Ferreira T, et al. 2012. Insights from Veterinary Medicine: Dermatology in Dogs and Cats.
4. Olivry T, DeBoer D, Favrot C et al. 2009. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. Veterinary Dermatology (21): 233-248.

Para más información y pedidos: 93 270 62 70 www.livisto.es