

Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la OA canina

ZOETIS HA DESARROLLADO UN COMPLETO PROTOCOLO PARA ABORDAR LA OSTEOARTROSIS (OA) EN PERROS, UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE BAJO GRADO INFLAMATORIO QUE AFECTA LAS ARTICULACIONES, PROVOCANDO DOLOR Y PÉRDIDA DE MOVILIDAD. ESTE NUEVO ENFOQUE TIENE COMO OBJETIVO FACILITAR A LOS PROFESIONALES VETERINARIOS UNA GUÍA DETALLADA Y PRÁCTICA, CON BASE CIENTÍFICA, PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA OA.

El protocolo propuesto incluye múltiples etapas, empezando por la detección proactiva mediante cuestionarios que ayudan a los tutores a identificar posibles síntomas. A esto le siguen una evaluación clínica integral, pruebas complementarias y la confirmación de la OA clínica. Una vez diagnosticada, se establece un tratamiento personalizado.

La piedra angular del tratamiento es un abordaje multimodal, que combina soluciones farmacológicas y no farmacológicas. En el plano farmacológico, destaca el uso de Librela (*bedinvetmab*), un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando el receptor del factor de crecimiento nervioso (FCN), aliviando eficazmente el dolor crónico. Existen otras terapias aprobadas para el control del dolor de la OA que pueden ser útiles en ciertos casos: Trocoxil (*mavacoxib*) o Rimadyl (*carprofeno*).

En cuanto al enfoque no farmacológico, se recomienda el control del peso, ejercicio adaptado, fisioterapia y suplementos como Omega-3 y colágeno tipo II. El seguimiento regular mediante cuestionarios como el LOAD (*Liverpool Osteoarthritis in Dogs*) y la grabación de vídeos para evaluar la evolución junto al tutor son herramientas clave del protocolo.

Con este lanzamiento, Zoetis busca no solo mejorar la calidad de vida de los perros afectados por OA, sino también apoyar a los profesionales veterinarios con recursos eficaces y basados en la evidencia. 🐾



im_veterinaria

IM Veterinaria

48 publicaciones 295 seguidores 540 siguiendo

El medio especializado en el entorno veterinario en general.
#Veterinaria #Animales #España
Aquí puedes leer nuestras noticias
www.imveterinaria.com y 2 más

IM VETERINARIA

SÍGUENOS EN INSTAGRAM

www.imveterinaria.es

Protocolo Osteoartrosis canina (OA)

Librela®
Bedinvetmab



LOAD: Liverpool Osteoarthritis in Dogs


zoetis

Tratamiento de la OA clínica*

Primera línea farmacológica según recomendaciones del COAST¹

Librela
Bedinvetmab


Anticuerpo monoclonal anti-FCN



OA Leve

1  **Librela**
Bedinvetmab
mes mínimo


Interrupción probable



OA Moderada

2  **Librela**
Bedinvetmab
meses mínimo

Interrupción posible



OA Severa

3  **Librela**
Bedinvetmab
meses mínimo

A menudo de por vida

⇒ En cualquiera de los estadios se podrá alargar el tratamiento con Librela® tantos meses como sea necesario acorde a la clínica del animal. (No hay límite de dosis máximas).²

⇒ En los casos que se requiera de más poder analgésico por picos de reagudización de la OA, se recomienda el uso de terapias adyuvantes.

Otras terapias aprobadas para el tratamiento de la OA

Trocoxil
Mavacoxil

1 comprimido mensual

2 mg/kg, junto a la comida principal, se repetirá a los 14 días y posteriormente el intervalo de dosificación será de un mes.

RIMADYL

1 administración diaria

4 mg/kg/día, comprimidos masticables.

⇒ Si utilizamos un AINE, saber que hay respuesta individual a los AINEs, si uno no funciona, hacer periodo de lavado recomendado por el laboratorio y utilizar otro AINE.

* Trocoxil: Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a enfermedad articular degenerativa en perros, en aquellos casos en los que esté indicado un tratamiento continuo que exceda de un mes.

Referencias:

1. Cachon et al, COAST Development Group's international consensus guidelines for the treatment of canine osteoarthritis. Frontiers in Veterinary Science, 3 August 2023. DOI 10.3389/fvets.2023.1137888.

2. Ficha técnica Librela®.

Primera línea no farmacológica



Pérdida de peso



Modulación del ejercicio



Fisioterapia



Suplemento articular

- Omega 3
- Colágeno NO desnaturalizado tipo II

Escanee los QR para acceder a las fichas técnicas. En caso de duda, consulte con su veterinario



Librela®



Trocoxil®



Rimadyl®

zoetis